



Brandbæger

- Bekæmpelse uden brug af kemikalier

Brandbæger ønskes bekæmpet for at forbedre husdyrs sundhed og velfærd. Når dyr græsser, vil de ofte gå uden om de bitre planter. Ved græsmangel kan dyrene være tvunget til at æde planterne, og det kan medføre skader på organer og senere dødsfald.

Der er forskel på, hvor store mængder brandbæger, der skal til, før husdyr bliver syge og dør.

Hestene bliver let forgiftet af brandbæger. Forgiftningen kan vise sig som en akut forgiftning, men en snigende kronisk forgiftning er mere almindelig. Det kan ske, at heste tramper planterne ned, så de tørrer ud og mister den bitre smag. Det øger risikoen for, at hestene æder de giftige planter sammen med græsset.

Kvæg, får og geder er mindre følsomme over for de giftige stoffer i brandbæger.

Mekanisk bekæmpelse

Mekanisk bekæmpelse er enten håndlugning eller afpudsning.

Ved håndlugning skal planterne fjernes fra arealet og efterfølgende destrueres.

Når man afpudser, skal planterne have en særlig højde og være i begyndende blomstring. Græsmarker med brandbæger skal afpudses helt i bund, og planterne skal rives sammen og fjernes. Hvis planterne ikke sætter sideskud, er afpudsningen vellykket. Det betyder, at afgræsning kan fortsætte, og arealet kan bruges til ensilage, wrap og hø.

Fakta om brandbæger

Alle brandbæger indeholder det giftige stof Pyrrolizidin Alkaloider. Indholdet er størst i almindelig brandbæger og engbrandbæger.

Vårbrandbæger

Har fjerfligede blade med kruset, tandet rand og kurve i åben halvskærm. Den blomstrer i maj og juni.

Engbrandbæger

Har fjersnitdelte blade og kurv i tæt blomstrende halvskærm. Den blomstrer i juli, august og september



Engbrandbæger



Vårbrandbæger